

SPRING BLUSH®

EA 3126TH (cov en trámites)

SPRING BLUSH® es una variedad muy precoz de época EARLY BLUSH®Rutbhart, antes de SYLRED(cov) y bien adaptado en zona mediterránea.

Fruta

- **Maduración** : Muy precoz, 1 a 2 días después EARLY B Durante el 2nd y 3a pases. 4 días antes SYLRED.
 - **Sabor** : Buena si se recolecta en su punto.
 - **Carne / Piel** : Carne anaranjada, jugosa y firme. Piel medianamente fuerte, resiste muy bien a las manipulaciones y a la calibración mecánica pero puede ser sensible a manchas jaspeadas si los árboles son muy fertilizados en “azote” los 2 primeros años de fertilización. Este caso se ha visto en condiciones de “sobre injerto”.
 - **Conservación** : Muy buena para una fruta de esa época de maduración, conservación en frío (1semana) y en escaparate (1 semana) gracias a su piel y a su textura de carne.
 - **Presentación** : excelente, de forma redonda/ovalada con un color de fondo muy anaranjado, muy bonita chapa roja lavada sobre mas de 60/70 % de la superficie de las frutas expuestas al sol.
 - **Calibre** : Bueno a gordo para la época de maduración, 2A (55%) / 3A (35%). Hoy podemos estimar el potencial en 15T/ha en vergel adulto pero pensamos poder aumentarlo después de los ensayos realizados por las estaciones de investigación.
 - **Cosecha** : En 2 a 3 pases. MUY IMPORTANTE : el primer pase tiene que ser cuando las frutas están con un color de fondo de 7 mínimo, 8 en el código CTIFL. Ningún desgarro pistilar constatado. Buena permanencia de los frutos en los árboles.
- CUIDADO** : una cosecha demasiado precoz penalizará la calidad de la fruta y podría tener consecuencias nefastas sobre el mercado a principio de temporada. ¡ Seamos profesionales !

Árbol

- **Vigor** : Bueno. El porte del árbol es semi erecto y necesita estar abierto con ataduras
- **Corte / Conducta** : Favorecer la formación de los ramilletes de mayo cerca de las viejas maderas. La variedad produce frutas de calidad principalmente en madera de 2 años y dardos. ¿ Pellicos cuando se forma el árbol son aconsejados para multiplicar las “CHARPENTIERES” ? La formación de ramos en el interior del árbol son fáciles.
- **Fructificación** : Buena y rápida, pero será perjudicial producir sobre madera del año para optimizar la calidad de la variedad.

Flores

- **Floribundidad** : Indebte a normal, época TOM COT ® Toyaco (cov).
- **Polinización** : OBLIGATORIA con TOM COT ® Toyaco (cov), SOLEDANE (cov), PINHCOT ® Cotpy (cov), SYLRED (cov), BIG RED ® EA41006 (cov), EARLY BLUSH ® Rutbhart (cov) o SWEET RED ® Red sylvet (cov).
- Para una buena polinización, indispensable poner 2 variedades.



® : Marca registrada
 COV : Certificado de Obtención Vegetal / Multiplicación prohibida sin autorización

Representante en España (Cataluña - Aragón) :
 Fabián Nicolás 669 73 39 07

Contrato técnica :
 Franch SECALOT
 Tel : +33 619 05 78 36
 Email : franch@pepinieres-escande.com

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)
 Tél : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26
www.pepinieres-escande.com